

## DATOS FENOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS DE VARIEDADES DE KIWIFRUIT EN LAS NOGUERAS 2022

VARIEDAD	FLORACIÓN				RECOLECCIÓN					
	INICIO	PLENA	FINAL	Observaciones	PROD. (kgs)	Unidades comerc.	Gr/unid.	°Brix (18/10)	°Brix (8/11)	Observaciones
<b>MACHO TOMURI</b>	21-may.	<b>29-may.</b>	8-jun.							
<b>R 21</b>	23-may.	<b>28-may.</b>	1-jun.		No se cosechan los escasos frutos			6,16	7,03	
<b>HAYWARD (3)</b>	23-may.	<b>28-may.</b>	1-jun.		0					
<b>DORIS (9)</b>	29-abr.	<b>14-may.</b>	24-may.	Desfase de polinización con Tomuri. Necesita macho específico.	0					Nula cosecha por falta de polinización.
<b>MERIS (2)</b>	24-may.	<b>29-may.</b>	4-jun.		No se cosecha			6,10	6,95	Escasos sólidos solubles para cosechar

Se han helado (2 y 3 de abril) yemas recién brotadas de Doris y menos de otros. El resto brota en la primera decena de abril.