

CONTROLES FENOLÓGICOS EN VARIEDADES DE PISTACHO. CDA LAS NOGUERAS 2022

<u>Cultivo y VARIEDAD</u>		<u>Inicio de desborre</u>	<u>DATOS FENOLÓGICOS</u>			<u>Anotaciones de floración-cuajado</u>			
			<u>INIC.</u>	<u>PLEN</u>	<u>FIN</u>	<u>Intensidad flor</u>	<u>Inten. Cuajado</u>	<u>Res teórico</u>	<u>Observaciones</u>
Plantados en febrero de 2014. M: 7x6	MATEUR	07-abr	19-abr	30-abr	04-may	1	3,5	3,5	(mucha vecería)
	KERMAN	12-abr	28-abr	05-may	10-may	3	2	6	
	LARNAKA	09-abr	21-abr	27-abr	06-may	3,5	3	10,5	
	SIRORA	11-abr	27-abr	03-may	09-may	2,5	3	7,5	
Plantados en jul/2015. M: 7x6	LOST HILL	04-abr	22-abr	29-abr	07-may	3,5	2	7	(en relación a su porte)
	GOLDEN HILL	02-abr	20-abr	27-abr	08-may	4	1,5	6	(Idem.)
Plantados en febrero de 2014. M: 7x6	PETER	12-abr	23-abr	30-abr	12-may	4			
	ESPECIAL C	28-mar	20-abr	28-abr	9-may.	5			
Plantado jul/2015. M: 7x6	RANDY	23-mar	18-abr	27-abr	07-may	3,5			
Plantados jul/2015. Cultivo Intensivo (4x2 m).	LOST HILL	01-abr	22-abr	28-abr	07-may	2,5	1,5	3,75	
	GOLDEN HILL	30-mar	20-abr	27-abr	08-may	3	1,5	4,5	
	RANDY	23-mar	17-abr	26-abr	06-may	4,5			

24/5: Se ven algunos adultos de Clytra, sobre todo en Kerman, que causan daños muy leves y que van desapareciendo en 2-3 semanas sin necesidad de tratar. Se ve más en encinas de al lado.

0 (sin), 1 (escasa), 2 (baja), 3 media, 4 (alta) y 5 (muy alta).